



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

INDICACIONES ACORDADAS CON LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS FRECUENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO DE GARANTÍA DE PLAZO DE RESPUESTA QUIRÚRGICA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA (D 209/2001).

**Servicio Andaluz de Salud
Dirección General de Asistencia Sanitaria
Subdirección de Programas y Desarrollo
Servicio de Protocolos Asistenciales**

TRAUMATOLOGÍA



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



SUSTITUCIÓN TOTAL DE CADERA (81.51)

TRAUM.1

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S/SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia	PROCEDIMIENTO	
715.35	Osteoartrosis localizada sin especificar-pelvis y muslo	<p>Coxartrosis primaria o secundaria cuando no es susceptible de tratar con Osteotomía o artrodesis por avanzada edad cronológica u ósea y tiene alguna de estas características:</p> <p>–</p> <p>– <u>Coxartrosis destructiva de la articulación</u></p> <p>– Coxartrosis con dolor invalidante que no responde a tratamiento médico o imposibilidad de marcha</p> <p>– Procesos inflamatorios de articulación coxo-femoral con grave destrucción articular</p> <p>– Procesos inflamatorios de articulación coxo-femoral con dolor invalidante que no responde a tratamiento médico o imposibilidad de marcha</p> <p>– Necrosis de la cabeza femoral en estadio avanzado, dolor insufrible, o imposibilidad de marcha</p>	81.51	SUSTITUCION TOTAL DE CADERA
715.95	Osteoartrosis sin especific. general o local-pelvis y muslo			
715.15	Osteoartrosis localizada primaria-pelvis y muslo			
733.42	Necrosis aséptica cabeza y cuello de fémur			
820.09	Otras fracturas intracapsulares de cuello de fémur cerrada	<p>– Fracturas subcapitales en pacientes jóvenes en los que ha habido fracaso de Osteosíntesis o en Necrosis Avascular de cabeza de fémur.</p>	81.51	SUSTITUCION TOTAL DE CADERA
733.82	No unión de fracturas			



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



SUSTITUCIÓN TOTAL DE LA RODILLA (81.54)

TRAUM-2

DIAGNOSCO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA	PROCEDIMIENTO	
715.36	Osteoartrosis localizada sin especificar-pierna	<p>Gonartrosis primaria o secundaria cuando no es susceptible de tratar con Osteotomía o Artrodesis por avanzada edad cronológica u ósea y tiene alguna de estas características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gonartrosis destructivas con inestabilidad de la articulación o subluxación de la misma - Gonartrosis primarias o secundarias con dolor invalidante que no responde al tratamiento o imposibilidad para la marcha - Gonartrosis primarias o secundarias con situaciones de pseudobloqueo por existencia de cuerpos libres articulares - Procesos inflamatorios con graves destrucciones articulares, inestabilidad o subluxaciones - Procesos inflamatorios con dolor insufrible o imposibilidad de marcha - Necrosis de los cóndilos femorales con fragmento necrosado unido al resto de la estructura ósea - Necrosis de los cóndilos femorales con fragmento necrosado libre en cavidad articular - Rigidez articular causante de mala posición que impide deambulación 	81.54	SUSTITUCIÓN TOTAL DE LA RODILLA
715.16	Osteoartrosis localizada primaria-pierna			
715.96	Osteoartrosis sin especific. general o local-pierna			
715.26	Osteoartrosis localizada secundaria-pierna			



ARTROSCOPIA DE RODILLA (80.26)

TRAUM-3

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	PROCEDIMIENTO	
717.5	Desgarro menisco otros no codificados	<ul style="list-style-type: none"> - Cirugía meniscal ↗ Lesión de menisco, salvo en los casos en los que existan lesiones degenerativas - Cirugía de ligamentos cruzados ↗ Lesión de ligamentos en individuos jóvenes y activos ↗ Con cuadro no llamativo, en individuos mayores de 35 años y poco activos, abstenerse - Cirugía femoropatelar ↗ Sólo en casos de síndromes dolorosos femororotulianos en los que no sean precisas técnicas de realineación ↗ Contraindicada en inestabilidad rotuliana y ocasionalmente en artrosis femoropatelar - Lesiones osteocondrales ↗ Lesión que cause dolor, bloqueos o derrames de repetición - Patología sinovial ↗ Resección de plicas, sinovectomía o la extracción de muestras para biopsia - Cuerpos libres ↗ Cuerpos libres procedentes de fragmentos osteocondrales u osteofitos desprendidos - Cuerpos extraños ↗ Dependiendo del tamaño del cuerpo extraño - Fracturas articulares ↗ En algunos tipos de fracturas intraarticulares, sobre todo en las osteocondrales - Patología meniscal degenerativa asociada a gonartrosis compartimental - En sospecha de rotura meniscal degenerativa, asociada a gonartrosis de alguno de los compartimentos por trastorno de alineación <p>CONTRAINDICACIONES GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> ↗ Riesgo de infección ↗ Anquilosis parcial o total ↗ Grandes desgarros capsulares, por el riesgo de excesivo paso de líquido al espacio extraarticular - 	80.26	ARTROSCOPIA DE RODILLA
717.3	Desgarro ncc menisco interno			
717.2	Desgarro post menisc interno			
717.83	Rotura antig cruzado anterior			
717.40	Desgarro menisco ext no especificado			
717.7	Condromalacia rotula			
717.0	Desg asa cubo menisc interno			
715.36	Osteoartr loc nsp-pierna			
836.0	Desg menisco interno rod-rec			
717.43	Desgarro post menisc externo			
717.89	Desgarro int rodilla otros no codificados			
844.2	Esguinc lig cruzados rodilla			
717.49	Desgarro ncc menisco externo			
717.41	Desg asa cubo menisc externo			
717.6	Cuerpo libre en rodilla			
718.86	Desarregl ncc-pierna			
823.00	Fractura epifisis sup tibia-cd			
717.42	Desgarro ant menisco externo			
732.9	Osteocondropatia no especificado			
736.42	Genu varum			
715.16	Osteoartrosis loc primaria en pierna			
732.4	Osteocondrosis juvenil piern			



CIRUGÍA DEL HALLUX VALGUS (77.54, 77.53, 77.52, y 77.51)

TRAUM-4

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia	PROCEDIMIENTO	
735.0	Dedo Gordo del pie valgo Hallux Valgus (adquirido)	<p>– Paciente < de 55 años, con síntomas clínicos, ángulo metatarso-falángico de 25-35°, ángulo intermetatarsiano de menos de 15°, sin cambios degenerativos articulares y fallo de tratamiento conservador.</p> <p>– Pacientes < de 50 años, sin cambios degenerativos articulares, ángulo del hallux < 40° y ángulo intermetatarsiano primero y segundo <20°</p> <p>– Pacientes > 50 años, con Hallux Valgus >30°- 40° y artrosis de la articulación Metatarso- falángica.</p>	77.54	Escisión o Corrección de Hallux valgus.
735.2	Dedo Gordo del pie rígido Hallux rígido		77.53	Otra Bunionectomía (excisión de la exostosis) con corrección de tejido blando.
			77.52	Bunionectomía (excisión de la exostosis) con corrección de tej. blando y artrodesis.
			77.51	Bunionectomía (excisión de la exostosis) con corrección de tej. blando y osteotomía del primer metatarsiano.



CIRUGÍA DEL GENU VARO (77.27 y 77.37)

TRAUM-5

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia	PROCEDIMIENTO	
736.42	Genu Varo Adquirido	<p>Debe cumplir todos los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pacientes menores de 65 años, con afectación unicompartmental fémoro-tibial anterior - Leve o moderada afectación fémoro patelar - Suficiente calidad de la trama ósea - Varo clínico no mayor de 10° - Ligamentos laterales competentes - Movilidad conservada, al menos en un arco de movimiento entre 90° (-10°) 	77.27	Casos B: Osteotomía en cuña de tibia y peroné
715.36	Osteoartrosis localizada sin especificar – pierna		77.37	Otra división de hueso. Tibia y peroné
715.26	Osteoartrosis localizada secundaria – pierna			
715.16	Osteoartrosis localizada primaria – pierna			



LIBERACIÓN DEL TUNEL CARPIANO (04.43)

TRAUM-6

DIAGNOSTICO		INDICACIONES SAS/SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	PROCEDIMIENTO	
354.0	Síndrome del túnel carpiano	- Fallo a la respuesta al tratamiento conservador con presencia de atrofia tenar o debilidad significativa y sintomatología progresiva	04.43	Liberación del túnel carpiano



EXCISIÓN CARTÍLAGO SEMILUNAR DE LA RODILLA (80.6)

TRAUM-7

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./ SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	PROCEDIMIENTO	
717	Trastorno interno de rodilla	<p>Patología meniscal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roturas en asa de cubo susceptibles de bloqueo o con episodios repetidos de bloqueo. - Roturas parciales de menisco con dolor y dificultad o inseguridad para la deambulación. - Contraindicada en roturas de tipo degenerativo en rodilla artrósica o preartrósica. 	80.6	EXCISIÓN (PARCIAL O PARCELARIA) CARTILAGO SEMILUNAR RODILLA



EXCI SIÓN DEL DISCO INTERVERTEBRAL (80.51, y 03.09)

TRAUM-8

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia	PROCEDIMIENTO	
722.0	Desplazamiento del disco intervertebral cervical sin mielopatía	<ul style="list-style-type: none"> - Fallo del tratamiento conservador farmacológico y rehabilitador (tracciones, manipulaciones, electroterapia..) - Dolor recurrente en región cervical que se irradia a brazos y mano - Lumbociatalgia recurrente - Hernia discal en canal estenótico : con déficit neurológicos y ciatalgias - Recurrencia de déficit neurológico - Dolor lumbociático extremo - Déficit motor progresivo - Compresión importante de médula o raíces nerviosas mayor de un mes de duración debida a dicha anomalía 	80.51	Excisión de disco intervertebral
722.1	Desplazamiento de disco intervertebral torácico o lumbar sin mielopatía		03.09	Otra exploración y descompresión del conducto espinal
722.52	Degeneración disco intervertebral			
722.73	Degeneración de disco intervertebral torácico o lumbar con mielopatía			
738.4	Espondilosis adquirida			

